

# 宇宙惑星科学

牧野淳一郎

惑星学専攻

# 事務連絡

- 評価は小テスト(初回はなし)(レポートはなし)
- 連絡は **BEEF** か状況によって **Google Classroom** を使うので、**Gsuite** のアカウントを有効にしておくこと。「宇宙惑星科学1」の招待がいっているはずである。

# 講義概要

1. ビッグバン宇宙論: 2コマ分くらい
2. 天体形成(主に銀河): 2コマ分くらい
3. 星形成・進化、惑星形成: 3コマ分くらい

# 講義の目的

- 惑星形成を、宇宙における階層的構造形成全体の中で理解する
- 同時に、惑星形成研究を天文学・天体物理学研究の中で位置付ける
- そのために宇宙の始まり、銀河等の天体形成、星形成、惑星形成の順にトップダウンで話を進める

# ビッグバン宇宙論

- 宇宙論の歴史
- 現在の描像
- 残っている問題
  - インフレーション
  - ダークマター
  - ダークエネルギー

# 天体形成

- 大規模構造・重力不安定(ジーンズ不安定)
- 重力熱力学的不安定
- 円盤構造、軸対称不安定、スパイラルモード
- 銀河形成
- 銀河と太陽

# 星形成と惑星形成

- 星形成
  - 星形成を考えるいくつかの立場
  - 初代星
- 恒星進化
  - 星の一生
  - 中性子星・ブラックホール・重力波
- 惑星形成の標準ないし京都/林モデル
  - **minimum solar nebula model**
  - シナリオ紹介
  - 理論的問題
  - わかっていないこと

# ビッグバン宇宙論

- 宇宙論の歴史
- 現在の描像
- 残っている問題
  - インフレーション
  - ダークマター
  - ダークエネルギー

# 宇宙論の歴史

- 何故歴史を述べるか？
- 古代・ギリシャ
- コペルニクスと地動説
- 星、銀河、系外銀河
- 宇宙膨張
- ビッグバン宇宙論とマイクロ波バックグラウンド
- 宇宙の大規模構造: **CfA** サーベイから **SDSS** サーベイまで
- マイクロ波精密観測: **COBE**、**WMAP**、**PLANCK**、そして...、

# 何故歴史を述べるか？

- 物理学(力学とか量子力学とか)の講義では(まあ教科書によるが)歴史はあんまりやらない。
- 「最新の素粒子研究」とかだとどうしても歴史は必要。
- 力学とか量子力学は、(その研究が専門の一部の研究者以外には)数十年とかもっと前に確立してあんまり変わらないもの。ニュートンのプリンキピアに書いてあることが根本的に変わったわけではない。
- 宇宙論は、**10-20年**程度でかなり大きく変わってきた。
- なので、現在只今の宇宙論を、力学とか量子力学程度に確立した正しいものと考えるのはちょっと無理。

# 何故歴史を述べるか？(続き)

- 一方、宇宙論を考える上での物理法則は、素粒子論の色々はあるが(この話はあとで詳しく)基本的にはこの**10**年くらい変わっていない
- なので、(おそらく)変わらず正しいことと、変わるものかもしれないことがある、ということを学んでほしい。

# 古代・ギリシャ

- ホメロス・ギリシャ神話の世界: 大体地中海世界くらいの周りに「オケアノスの大河」
- 「地球」という考え方: 少なくともヘレニズム世界では普通だった模様。エラトステネスによる地球の半径・月の半径・月までの距離・太陽までの距離・太陽の半径の測定(太陽は**10倍**くらい小さく評価)
- プトレマイオスの「天文学」(アルマゲスト): 天動説に基づいた体系で天体の運動を高い精度で説明。円運動+周転円・離心円等。

# 余談：エラトステネスによる 地球の半径の測定

## 方法の(時々見る)説明

(<http://www.asahi.com/edu/nie/tamate/kiji/TKY200508220108.html>)

- エジプト南部のシェナの町では、夏至の日の正午に太陽は真上にくる。
- そこから **800km** 離れたアレクサンドリアでは、同じ時刻に **7度(7.2とか7.5とか)** 資料によって数値がバラバラ、、、)真上からはずれていた。
- これは、**800km** が地球の一周の **7/360** に相当するということ。従って地球1周は**4万km**くらい。

# これちょっとおかしい

- どうやって、シェナとアレクサンドリアで「同じ時刻」に？
- 紀元前に正確な時計があったわけはない。

# これちょっとおかしい

- どうやって、シェナとアレクサンドリアで「同じ時刻」に？
- 紀元前に正確な時計があったわけはない。

答はもちろん：

- アレクサンドリアはシェナのほぼ真北にある。
- 「同じ時刻」でなくても、アレクサンドリアでの正午でいい(もちろん結果的には大体同じ時刻になる)
- 正確に真北でなくても、また正確に正午でなくてもあまり答はずれない。(ずれの割合を  $x$  として答のずれは  $x^2$  程度)

# アレクサンドリアとシェネ



シェネは現在のアスワンの位置のこと。

- 全然「真北」ではない。
- が、当時は「真北」にあると考えられていたらしい。

# 文化・神話と宇宙論

- 大抵の文化・社会・文明は創成神話を持つ。文化人類学の研究対象の様々な社会、古代文明、そして現代の我々も。
- 「我々はどこからきて、どこに行くのか」
- 創成神話と宇宙論はどの社会でも一体。創成神話はたいてい、「大地はどうやって作られたか」を含む。「どうやって支えられているか」も結構ある。
- ここで神話学はしませんが、、、
- ローマ世界、中世からルネサンスまでのヨーロッパ世界を支配したキリスト教の宇宙像は、プロトトイオスの宇宙をキリスト教の教義にあわせたもの
- 「地球」は中世には一度失われたようでもある、、、

# 天動説と地動説

## キリスト教的天動説

- 地球は宇宙の中心
- 天上・地上・地獄の同心球構造 ダンテ「神曲」とか、、、
- 天上の世界は神・天使のもの

なので：天動説と地動説の対立は、単に地球が太陽の周りを回っているのかその逆か、という話ではない。地動説はキリスト教の宇宙像の根本からの否定。

- 太陽が中心
- 地球は他の惑星と同じ（逆にいふと他の惑星も「天上の存在」ではない）

# 天動説と地動説

ありがちなお話: 天動説では惑星の動きを上手く説明できない

- 天動説は多数の周転円を必要とする。プトレマイオスではエカントも必要とした。
- 地動説は単純

これは実は正しくない。コペルニクスの地動説では、太陽や惑星は円運動する、というのはプトレマイオスと同じなので、周転円やエカントはやはり必要。何故か数が増えたりした。

# 周転円って？

- 天上の世界は「完全」である
- 完全な運動とは等速円運動である

ということで、月から上の天体(太陽も、金星等の惑星も)全て等速円運動しかしないとした。

- 惑星はあっちいたったりこっちいったりする
  - 正確に測定すると太陽も月も等速円運動ではない
- 複数の円運動の重ね合わせだとする。

# エカント



- 実は周転円だけではなかなか上手くいかない
- 天体の軌道の円の中心を地球からずらし、さらにその中心からみて地球の反対側で地球と同じ距離にある点からみて天体は等角速度運動をしているとした
- これだとかなり上手くできる。

# では何故地動説のほうがよいのか？

## その後の経緯

- ティコ・ブラーウによる精密観測(但し、ティコ本人は、恒星の年周視差が観測できなかつたので地動説には否定的)
- ティコの観測からの、ケプラーによる、惑星が太陽の周りを橙円運動することの発見
- ガリレオによる木星の衛星の発見(天動説というよりキリスト教的宇宙観と矛盾)
- 古典力学の成立: ニュートンによる橙円軌道の説明

# ケプラーとニュートン




ケプラー (1571-1630)

ニュートン (1642-1727)

# ケプラーの3法則

- 惑星の軌道は太陽を1つの焦点とする橍円
- 「面積速度」は一定
- 軌道周期は軌道長半径の1.5乗に比例



ニュートンの  
万有引力の法則

$$F = -G \frac{Mm}{r^2}$$

こっちが大事、ということ

# 太陽系はいいとして、「宇宙」は？

## 地動説の宇宙

- コペルニクス・ケプラー・ガリレオ: 宇宙の中心に太陽
- ジョルダノ・ブルーノ (**1548-1600**): 太陽は恒星の1つ  
(この説と、他の色々な説のせいで異端審問、火刑)
- ニュートンの頃には太陽は恒星の一つという理解になっていた模様。

恒星の年周視差が実際に観測されたのはベッセルによって  
**1838**年のこと。ニュートンが活躍した頃からさらに**150**  
年後。

## ニュートンが考えたこと：

太陽と同じような星が宇宙全体に広がっているとすれば、それらはお互いの重力で集まったり落ちてきたりぶつかったりしないか？

## 本人が考えた解答：


落ちてくるのには**1億年**くらいかかるから大丈夫（というか、宇宙の年齢がこれで決まる？）

以下この辺の話

# 星、銀河、系外銀河

18世紀: W. ハーシェル (1738-1822)


「全ての星は同じ明るさ」と仮定して距離を求めて書いてみた。



星の分布は一様ではなくてひらたくなっている = 銀河の発見

# 星がみんな同じ明るさのはずないのでは？

それはまあそうなんだけど、地球からみた方向によって星の明るさが違うのでなければ傾向は同じ。




結果の本質が変わらない範囲で物事を単純化するのはとても重要なこと

# 20世紀初め: H. シャプレー


ケフェウス型変光星は変光周期と明るさに関係がある  
= 変光周期と明るさがわかれば距離がわかる

Shapley's Globular Cluster Distribution



太陽系は銀河系の中心にあるわけではない。


# 20世紀初め: E. ハッブル (1)



「星雲」と呼んできたものの多くは我々の銀河系と同じような銀河

銀河は「ハッブル系列」によって分類できる

# 20世紀初め: E. ハッブル (2)



遠くの銀河ほど速く  
我々の銀河系から遠  
ざかっている  
「宇宙膨張」

我々の宇宙は「ビッグバン」から始  
まった

ハッブルのデータは距離が**10倍**近く間違ってたので、宇宙の年齢が地球の年齢より短くなった、、、

(地球の年齢はいつごろどうしてわかったかは私でない誰かに  
きいて下さい)

# ちなみに

ケルビン卿(とても偉い物理学者)は、「進化論はおかしい」と  
ダーウィンを攻撃したらしい

- 太陽の明るさが今とあまり変わらない期間: **7000**万年よりずっと短い(重力収縮で光っているとした)
- ダーウィンの進化論での、現代の生物に進化するまでの必要時間:数億年

ケルビン卿の時代には知られてなかったけど現代の我々は  
知っていること: 太陽は核融合で光っていて、寿命は**100**億年

# もうひとつ余談

- 系外銀河と我々の銀河系の関係についても、太陽と恒星の関係のような論争があった。(シャプレー・カーティス論争、あるいは「大論争 **The Great Debate**」) 1920年
- シャプレー:アンドロメダとかの星雲は銀河の中にある
- カーティス:外にある

決着がついたのは、ハッブルによってアンドロメダ星雲の中に変光星が見つかって距離が(間違っていたけど)わかったあと。

宇宙論の歴史は、地球が宇宙の中心でなくなっていく歴史でもある。太陽、我々の銀河、系外銀河、、、

# 宇宙膨張と銀河

2つの問題がある。

- 宇宙全体としてはなにがおきているのか
- 一つ一つの星、太陽系、銀河とかについてはどうか？

ちょっと別の(でも重要な)問題:

- 本当に「宇宙の始まり」があるのか？
- あるなら、最初はどうなっていて、「その前」はどうなってるのか？

# 宇宙全体としてはなにがおきているのか？

「宇宙論」の基本的問題。

=宇宙空間というものはどうやってそこに存在できているか？

一般相対性理論で初めて本当に扱えるようになった問題。

私は良く知らない

# ものが落ちないようにする方法

- 「反重力」でささえる
- 宇宙は広がっているということにする。重力で減速はしている。
- 上の**2**つの組合せ

「反重力」なんての超科学かトンデモかと思うかもしれないけど、これはそうでもなくて[アインシュタイン自身のアイディア](#)。そういうもの（宇宙項）があるということになると空間が落ちてこないで済む。

# 宇宙膨張

宇宙が全体として膨張しているとすればアインシュタイン方程式に宇宙項をつけなくても解がある：ルメートルとかド・ジッターのアイディア。これは **1920** 年ころ。

遠くの銀河を観測すると本当に距離に比例した速度で遠ざかっているらしいとわかつてきただのが **1930** 年頃。

最初は速度一距離の比例係数の見積りがいまと **10** 倍違ったのでいろいろ混乱があった。

# 宇宙膨張の問題点

当初の問題：

宇宙の年齢が今の **1/10** になって、放射性元素で決めた地球の年齢よりずっと若くなった。

これを回避するために、「膨張するけれど定常で年齢は無限大」といったモデルも考えられた。

最近は大きな矛盾はなくなってきた（一応）。


# 宇宙が膨張するって？

- 一応正しいんだけどあまりわかった気がしない説明:

AINシュタインの一般相対性理論の方程式を、「宇宙が空間的に一様」として解くと、「静止している」という解はなくて「膨張している」か「収縮している」である

謎な定数をいれて静止解も出すことはできるが

- もうちょっと感覚的な説明:



宇宙に物質があれば、必ず重力があって、お互いにひきあう。なので、「止まっている」解はない。全体として膨張、全体として収縮、はあります。

重力のため、段々膨張がゆっくりになる。


# どんなふうにゆっくりになるか？

- 現代の宇宙物理学の基本問題だった。2000年代はじめまでほぼ1世紀に渡る論争
- 15年くらい前までの支配的な考え方:(意味はちょっとおいて)「平坦な宇宙」
  - 無限の未来に膨張速度がゼロに近づく
- 最近の観測からの示唆:実はゆっくりにならない。無限の未来に無限に速くなる

非常に予想外な発見。

# 宇宙膨張の加速

遠方の超新星の明るさを観測する：同じ「赤方偏移」でも膨張のしかたで距離、従って明るさが違う



- 普通に平坦な宇宙：明るい
- 物質が少ない宇宙：暗い
- 膨張が加速している宇宙：もっと暗い  
これが我々の宇宙

**2011 年ノーベル物理学賞**

膨張を加速しているなにか=ダークエネルギー

# 現実の宇宙は？

決定的な証拠があるかどうかにはまだ議論がないわけではないが、いまのところいろいろな観測結果ともっとも矛盾しないのは、

- 無限に膨張する
- しかも、単純な双曲線解よりも最近膨張が速くなっている

というのが一番「本当らしい」

加速するもの = ダークエネルギー(これもダークマターと同様、名前つけただけ)

この観測が**2011**年のノーベル賞

# 銀河等はどうやってできたか？

- 宇宙全体は一様に膨張しているとすると、惑星とか、太陽とか、銀河はどうやってできたのか？
- 銀河は重力で星が集まっているだけなのにどうして潰れてしまわないのか？

という問題は依然として残っている。

まず、どうしてそれら、とりあえず銀河とか、ができたのか？ということ。

# 重力不安定による揺らぎの成長

- 宇宙全体としては、(非常に大きなスケールでは)一様で密度一定であるとしても、小さなスケールになると揺らぎのために一様からずれている。
- 宇宙が熱い火の玉から現在まで膨張する過程で、その揺らぎが自分自身の重力のために成長して、ものが集まつてできるのが銀河とか銀河団

では、銀河はどんなふうにできるのか？

# 宇宙はなにからできているか

- そのへんにある普通の物質：バリオン（陽子、中性子）+電子でできている。
- 宇宙のバリオンのほとんどは水素原子のまま（ビッグバンの最初にヘリウムやリチウムが少しできて、あとは星のなか、特に超新星爆発の時にもっと重い元素が核反応で作られる）

# ダークマター？

見えるバリオンの量（星と、あとは電波やX線でみえる水素ガスの量）：例えば銀河系の質量や、銀河団の質量のほんの一部でしかない。

銀河：回転曲線

銀河団：X線ガスの温度から質量を推定

- 重力の理論が間違っている？
- なんだかわからないものがある？

# ダークマター

- どちらが本当かというのは簡単にはいえないわけだが、今のところ「なんだかわからないものがある」というほうが主流。
- これはいろいろな状況証拠があるが、（僕の意見としては）大きいのは重力理論が違うことにした時に、銀河毎に重力理論が違うというわけにはいかない（統一的な説明があるはず）とすると説明が難しいということ。

# ダークマターは何か？

大きくわけて 2 つの理論：

- **Hot dark matter** 質量をもったニュートリノが大量にあって、それが宇宙の物質のほとんどを占めている。
- **Cold dark matter** 未知の素粒子があってそれが宇宙の物質のほとんどを占めている。

実はニュートリノではうまくいかないということがわかって いる。この場合銀河団とか大きいものはできていても銀河はまだできていないことになってしまうため。

ダークマター候補として最近有力だった粒子の存在の証拠は **LHC** で見つかるかもと言われていたがまだ見つかってない。

# 現在の宇宙に対する我々の基本的な理解

- 宇宙の物質のほとんどは、偉そうにいえば「未知の素粒子」、わかりやすくいえばなんだかわからないものである。
- 宇宙は全体としては一様だが、揺らぎがあって完全に一様なわけではない。宇宙膨張の間にその揺らぎが成長して銀河とか銀河団ができた。

こういった理解が正しいかどうか：本当にこういうやり方で現在の宇宙の構造ができるかどうかを計算機シミュレーションで調べることである程度はチェックできる。

# ビッグバン宇宙論とマイクロ波バックグラウンド

- 宇宙膨張はいいとして、「宇宙に始まりがある」なんてのは認め難い、という人は一杯いた(まだ生きている人もいる)
- 有名な人の一人: **Fred Hoyle**
- ケンブリッジの **Institute of Thoretical Astrophysics** の所長 **Fred Hoyle (1915-2001)** もやった、**Sir** の称号もある。
- 「ビッグバン」という名前はこのひとが悪口としていました。



ビッグバンでないとすると、…

色々な理論が提案された(されている…)

- 定常膨張モデル: 宇宙膨張はある。どこからともなく物質がわいてくる。
- そもそも膨張していない。赤方偏移は膨張によるものではない。

# ビッグバン宇宙論とマイクロ波バックグラウンド

ビッグバン宇宙論から予言できたこと(1950年前後)

- 元素合成
- マイクロ波バックグラウンド

(ガモフ他による)

# 元素合成

- 最初の宇宙はものすごく密度が高い。どういう物質かは素粒子論の話。
- どっかの時点で通常の核物質(中性子、陽子+電子)になり、さらに膨張して密度が下がる過程で水素原子、重水素、三重水素、ヘリウムになる。
- 当時の「弱い相互作用」の理論からヘリウムの量を予言した。恒星内に大量のヘリウム**4**(質量比で大体**1/4**)あることを自然に説明。
- 他の元素(ヘリウム**3**、重水素、リチウム**7**)等の量から「物質の量」が決まる。(観測と、、、)

# マイクロ波バックグラウンド

- 元素合成が終わるとほぼ水素+ヘリウムの宇宙。最初は温度が高いのでプラズマ状態
- **30**万年くらいたつと、温度が**3000K**くらいまでさがってプラズマから中性の原子に
- それまで、輻射と物質が熱平衡だったのが、物質がいきなり透明になる
- 輻射は、その後宇宙膨張によってひきのばされて、現在の宇宙では**2.7K** のマイクロ波となって観測される

これもガモフ他が**1940**年代に予言

# マイクロ波バックグラウンドの観測

- 1964年、ベル研のペンジアスとウィルソン、電波天文学のための電波望遠鏡を作っていた
- 謎な雑音がどうしても消えなかった。
- ちょうどそのころ、プリンストン大学(ベル研と同じニュージャージー州)のディッケ、ピーブルスといった人達が、全く独立にビッグバンからの電波の観測計画を立てようとしていた。
- ペンジアスの友人がピーブルスの論文のプレプリントをみていて、関係あるのでは?といったので、ペンジアスらはディッケらにコンタクトして相談し、「同時に」「別々に」**Astrophysical Journal** にレター論文をだした。  
**(1965)**

# マイクロ波バックグラウンドの観測

- 1978年にペンジアスとウィルソンはノーベル賞もらつた。ディッケ、ピーブルスは、、、

<https://www.bell-labs.com/about/stories-changed-world/Cosmic-Microwave-Background-Discovery/>

# マイクロ波で実際に見えるもの

- ものすごく正確に熱平衡分布(プランク分布)に近い電波が
- 宇宙のあらゆる方向からものすごく高い精度で同じ強さで

きているのが観測された。これは、一方ではビッグバン宇宙論をサポートする証拠である。陽子と電子の結合(何故か再結合 **recombination** という)が起こったことを示す。

が、他方で、「あまりに正確に一様過ぎる」という問題を引き起こした。

# 一様過ぎることの問題

- ある範囲で十分に一様になるためには、その範囲でほぼ熱平衡になる必要がある。
- しかし、そのためには少なくともその範囲の大きさがその時点での宇宙年齢で光が届く距離より小さくなければならない。
- ところが、普通の宇宙モデルでは、宇宙膨張は次第に減速していくため、現在見えているマイクロ波背景輻射は、当時の宇宙の「外側」からきている。
- つまり、違う方向からの輻射が全て熱平衡にあったはずはない。

# インフレーション

A. Guth、佐藤勝彦らがほぼ同時、独立に提唱

- インフレーションモデルでは、ビッグバン後のある時期に宇宙が指数関数的に膨張したとする。
- 宇宙膨張が指数関数的なため、元々は宇宙の内側だった領域がはるかに外側まで広がる
- マイクロ波背景輻射がきているのはその時には宇宙の外側だったとしても、インフレーション前には内側だったので問題ないことになる。

それ単に都合のいい仮定をもちこんだだけでは？という気もするが、、、

# インフレーション(続き)

- 何故インフレーションのようなことが起きるか、ということに説明がついているわけではない
- が、そのようなことがおきたとすると、いろいろなことが決まってしまう。(しかも妙に上手くいく)
- 特に、銀河等の成長の種となる密度ゆらぎの波長依存性が、インフレーションを仮定すると、宇宙そのものに量子ゆらぎがあるということから説明される。
- 「宇宙全体」がもっていた量子ゆらぎが、インフレーションによって宇宙がひき伸ばされるとそのまま固定されるので、基本的には波長によらずゆらぎの大きさが同じになる

# インフレーションモデルの問題点と現状

## 明らかな問題点


- 始まりは適当な場を仮定すれば起こるが、何故止まるのか？
- 適当な場は本当にあるのか？
- あるかどうか確認する方法はあるのか？

よくわからないが、しかし

- マイクロ波背景放射のゆらぎ(あとでもうちょっと述べる)
- 銀河の分布

はインフレーションが予言するものと非常に良く一致。

# マイクロ波精密観測



**PLANCK**衛星によるマイクロ波背景輻射ゆらぎの角度依存性の観測結果

# マイクロ波精密観測

これだけからやたら色々なものが精密に決まる。

$\Omega$ : 物質・エネルギーの密度 (物質だけの場合、放物線  
解: $\Omega = 1$

$\Omega_\Lambda$ : 物質以外のエネルギーの密度

$\Omega_b$ : 物質(宇宙物理では「バリオン」という)密度

ダークマターの密度

宇宙年齢

密度ゆらぎの大きさ

密度ゆらぎのスケール依存性(べき指数)

# というわけで、現在の理解をもう一度

- 物質+ダークエネルギーで「平坦」
- ダークエネルギーは重力とは逆に働いて、空間を膨張させる。遠い未来には指数関数的に膨張
- つまり、宇宙初期のとは違うけれど、現在の宇宙も「インフレーション」的な膨張過程にある
- 「ダークエネルギー」は、全く正体不明。ほぼ名前つけただけ

# 最近の考え方

- 宇宙の「始まり」を考えなくても、そこらじゅうでインフレーションしていると思えばいい。
- 何故かインフレーションが止まったところで色々な「宇宙」ができる。
- (これはある意味ビッグバンから定常宇宙にもどっている気も)